



GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur

Instituto de
Servicios de Salud
Gobierno de Baja California Sur



Boletín del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Intoxicación por Animales Ponzonosos 2º Trimestre 2026 Semanas epidemiológicas 01-26





GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

Secretaría de
Salud
Gobierno de Baja California Sur

Instituto de
Servicios de Salud
Gobierno de Baja California Sur

· DIRECTORIO

Secretaría de Salud de Baja California Sur

Dra. Ana Luisa Guluarte Castro

Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dra. Patricia Romero Sillas

Directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dr. Alfredo Ojeda Garmendia

Subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur

Dr. Samuel Enoc Ávila Borjas

Jefe del Depto. de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas de la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur



ELABORÓ

SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Dr. Francisco Javier Espinosa Gutiérrez

Coordinador Estatal de Epidemiología
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles

L.E. Cynthia Adriana Barrera de Los Reyes

Responsable del Registro electrónico de las
Defunciones en Vigilancia Epidemiológica
(REDVE), SVETNE y SIVEPAB





Introducción

Las intoxicaciones por mordeduras o picaduras de **animales ponzoñosos** representan un **desafío para la salud pública**, debido a su capacidad de generar trastornos locales y sistémicos de **gravedad variable** que, en casos severos, pueden llevar a la muerte. Este fenómeno afecta tanto a **humanos como a animales** en entornos rurales y urbanos.

Bajo este **sistema especial de vigilancia epidemiológica**, se prioriza el seguimiento de incidentes provocados por **alacranes**, **serpientes** (cascabel y coralillo), **arañas** (viuda negra y violinista), así como **abejas y avispas**.





Incidencia


Los casos registrados de Intoxicación Aguda por Ponzoña (IAP) son prácticamente directamente proporcionales al lugar de ocurrencia y el de notificación (Figura 1)

Cuadro 1. Distribución de casos de IAP por ocurrencia y residencia a la SE 26 2026 en BCS.

Municipio	Abeja melífera	Alacrán	Araña Loxosceles (violinista)	Araña Latrodectus (viuda negra)	Serpiente cascabel	Otro especie de araña	Otra especie de serpiente	Otra especie de abeja	otro	Total de casos	Tasa
Comondú	0	2	0	1	1	9	1	1	0	15	20
Mulege	1	1	2	4	0	10	0	0	0	18	26
La Paz	8	5	3	2	1	6	0	0	1	26	8
Los Cabos	4	9	0	0	1	2	0	0	3	19	4
Otros	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-
Total de casos	13	17	5	8	3	27	1	1	4	79	-
Tasa agresor ponzoñoso	1.4	1.8	0.5	0.8	0.3	2.9	0.1	0.1	0.4	8.5	-

*Tasa x 100,000 habitantes

Figura 1. Distribución de Casos de IAP por Ocurrencia y Residencia a la SE 26 2026 en BCS




La entidad registra una tasa de 8.5 casos por 100 mil hab. (Cuadro 1); el municipio que presenta la tasa más alta es Mulegé con 26.0, seguida de Comondú con 20.0, La Paz con 8.0 casos y Los Cabos 4.0 casos x 100 mil hab., respectivamente. Loreto no reportó casos.

El animal ponzoñoso con la tasa más alta fue otra especie de araña con 2.9, seguida del alacrán con 1.8 x 100 mil hab.. respectivamente.




Identificación, escolaridad, ocupación y edad

Figura 2. Distribución de casos IAP por escolaridad a la SE 26 2026 en BCS




El **27%** de los casos han cursado por educación básica, el **16%** medio superior y el **5%** profesional.

Figura 3. Distribución de casos IAP por grupos de edad a la SE 26 2026 en BCS



Los grupos de edad más afectados fueron los menores de **5 años** y el de **26-30** años; los menos afectados fueron los de **11-15** años y **56-60**, con una mediana de **29 años**


Figura 4. Distribución de casos de IAP por sexo a la SE 26 2026 en BCS



El sexo masculino es el más afectado por las agresiones en un **59%**.



Figura 5. Distribución de casos IAP según Institución notificante a la SE 26 2026 en BCS



La Institución que más notificó fue el IMSS/OPD con un **42%**, seguido del IMSS ORD con el **37%**, la SSA con el **13%** y los Privados un **6%** y un **3%** ISSSTE.

Figura 6. Distribución de casos IAP según la ocupación a la SE 26 2026 en BCS



El **49%** de los casos reportados, son económicamente activos, el **15%** se dedica al hogar, el **19%** son estudiantes y el **4%** son pensionados y/o desempleados.




Región corporal afectada por mordeduras y picaduras

Cuadro 2. Región corporal afectada con mayor frecuencia por picaduras y mordeduras, según el tipo de animal ponzoñoso, durante el periodo

Animal ponzoñoso	Cabeza, cuello	Tórax	Extremidades
Abeja melífera	6		16
Alacran	1	2	17
Araña Latrodectus (Viuda negra)	1	2	7
Araña Loxosceles (Violinista)	1		3
Serpiente casacabel			3
Otra especie de abeja	2		2
Otra especie de araña	3		24
Otro (no especifican)	1		3

Aunque se identificó afectación en diversas regiones corporales, las extremidades fueron la región anatómica más frecuentemente afectada.

El **71%** de las agresiones ocurrieron en el domicilio.




La distribución de las agresiones según el horario fue relativamente homogénea. La **mañana** concentró la **mayor proporción** de casos (**37%**), seguida de la **noche** (**35%**) y la **tarde** (**28%**).



Tipo de atención médica

Figura 7. Distribución de casos IAP por tipo de atención a la SE
26 2026 en BCS



El **62%** de los pacientes recibió manejo ambulatorio, mientras que el **38%** requirió hospitalización.

El **66%** de los pacientes egresó en menos de 24 horas; el **20%** permaneció hospitalizado por más de un día y en el **14%** de los casos no se contó con información sobre la duración de la estancia hospitalaria.

El **79%** de los pacientes egresó por mejoría clínica y el **35%** recibió tratamiento con antiveneno.

El **14%** de los pacientes refirió antecedente de una agresión previa por algún animal ponzoñoso.



Generalidades

El sexo masculino fue el más afectado, con el **59%** de los casos, mientras que el **femenino** representó el **41%**.

Los grupos de **menores de 5 años** y de **26 a 30 años** concentraron la **mayor proporción de casos**, con **13%** cada uno.

Mulegé presentó la tasa de **incidencia más alta**, con **26 casos por 100,000 hab.**

Las **agresiones por otras especies de araña** presentaron la **mayor tasa de incidencia** (2.9 por 100,000 hab.), seguidas por las ocasionadas por alacrán (1.8 por 100,000 hab.).

El **71%** de las agresiones ocurrió en el **domicilio**.

El **62%** recibió manejo ambulatorio, mientras que el **38%** requirió hospitalización.

El **IMSS-Bienestar** (OPD) notificó el mayor número de casos (42%), seguido del IMSS Ordinario (37%); el porcentaje restante correspondió a la Secretaría de Salud, instituciones privadas e ISSSTE.

Dos pacientes con mordedura de serpiente de cascabel pertenecían a población indígena y hablaban zoque y zapoteco; no se reportaron barreras de comunicación durante su atención.