PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO MENSUAL DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA Y CÓLERA

Baja California Sur · Información acumulada 2026 (enero–junio) · Corte a la semana epidemiológica 26 (30 de junio de 2026)

1. RESUMEN EJECUTIVO

- **Morbilidad (SUIVE).** Se acumularon 20,046 casos nuevos de EDA en B.C.S., con una tasa estatal de 2,174.4 por 100,000 habitantes. Los Cabos concentró 54.0 % de los casos y La Paz 28.8 %; la tasa más alta correspondió a Loreto (2,875.3) y la más baja a Mulegé (1,598.3).
- **Persona.** 53.1 % de los casos fueron mujeres; el grupo de 25 a 44 años aportó 27.2 % del total (5,462 casos) y los menores de 5 años 10.7 % (2,145).
- **Vigilancia especial.** Se estudiaron 228 casos con hisopo rectal (100 % con muestra para *V. cholerae*); 187 (82.0 %) contaban con resultado de laboratorio y en 8 (3.5 %) se confirmó un enteropatógeno: 5 salmonelosis, 1 shigelosis, 1 diarrea por *V. cholerae no O1/no O139* (sin determinación de toxigenicidad) y 1 por *V. parahaemolyticus*.
- **Cólera.** No se registraron casos de cólera en la entidad. El único aislamiento de *V. cholerae* corresponde a una cepa no O1/no O139, que no cumple la definición operacional de caso.
- **Gravedad.** 29 casos hospitalizados (12.7 %), 95 con deshidratación grave (41.7 %) y 3 defunciones (letalidad 1.32 %), todas en residentes de La Paz de 62 años o más y sin enteropatógeno identificado.

2. MORBILIDAD POR EDA NOTIFICADA AL SUIVE

Municipio	Casos	Tasa*	Clasificación
Los Cabos	10,821	2,486.7	Moderada
La Paz	5,772	1,772.1	Baja
Comondú	1,747	2,559.2	Alta
Mulegé	1,204	1,598.3	Baja
Loreto	502	2,875.3	Muy alta
B.C.S.	**20,046**	**2,174.4**	**—**

Cuadro 1. Casos y tasa de EDA por municipio, B.C.S., 2026.

* Tasa por 100,000 habitantes. Clasificación por cuartiles de las tasas municipales del corte vigente.



Figura 1. Casos de EDA por grupo de edad y sexo, B.C.S., 2026.

3. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESPECIAL DE EDA Y CÓLERA: LABORATORIO

Agente	Procesadas	Positivas
V. cholerae	187	1
V. parahaemolyticus	187	1
Salmonella spp.	181	5
Shigella spp.	182	1
Rotavirus	5	0
E. coli (sin patotipo)	101	39
Pseudomonas spp.	187	24
Casos estudiados / total de aislamientos	**228**	**71**

Cuadro 2. Total de aislamientos de laboratorio por agente, B.C.S., 2026.



Figura 2. Casos estudiados y hospitalizados por semana de inicio.

Rechazo de muestras: de 193 muestras recibidas en LESP, 6 (3.1 %) fueron rechazadas por calidad inadecuada del hisopo; 35 casos (15.4 %) permanecen en proceso o sin registro de recepción. E. coli y Pseudomonas spp. se reportan sin caracterización de patotipo, los casos con enteropatógeno confirmado son 8 (3.5 %).

4. CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA Y GRAVEDAD

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Casos estudiados	228	Hospitalizados (tasa de hospitalización)	29 (12.7 %)
Mediana de edad, años (RIC)	37.5 (16.8–58.0)	Estancia hospitalaria, mediana (rango)	1 día (0–7); n = 15
Hombres / mujeres	117 / 111	Egreso por mejoría	12
Menores de 5 años / 60 años y más	23 / 56	Defunciones (letalidad)	3 (1.32 %)
Deshidratación grave	95 (41.7 %)	Probable fuente: alimentos / agua	189 (82.9 %) / 44 (19.3 %)
Plan C de hidratación	116 (50.9 %)	Toma de muestra ≤ 5 días del inicio	226 (99.1 %)

Cuadro 3. Perfil clínico-epidemiológico de los casos estudiados en el sistema especial, B.C.S., 2026 (n = 228).

5. SITUACIÓN DEL CÓLERA

- Durante el periodo no se identificaron casos de cólera en Baja California Sur. La búsqueda intencionada se sostuvo mediante hisopado rectal en el 100 % de los casos captados por el sistema especial (228 muestras), con toma dentro de los primeros cinco días del inicio de síntomas en 99.1 % de ellos.
- Se obtuvo un aislamiento de *Vibrio cholerae* no O1, negativo a O139, en una mujer de 65 años residente de La Paz con inicio de síntomas en la SE 14; egresó por mejoría y no se identificaron casos secundarios.
- Se documentó un brote de EDA en el periodo. La fuente probable de infección más señalada fueron los alimentos (82.9 %), seguida del agua (19.3 %); 93.9 % de los casos refirió consumo de agua de garrafón.

6. NOTAS METODOLÓGICAS Y FUENTES

Fuentes: (1) SUIVE/SINAVE, informe semanal de casos nuevos de enfermedad, corte a la SE 26/2026, con población CONAPO/proyecciones 2026 (B.C.S. 921,924 habitantes). (2) Base nominal 2026 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Especial de EDA y Cólera (plataforma SINAVE), filtrada por fecha de inicio de síntomas ≤ 30 de junio de 2026; municipio asignado por residencia. La SE 26 transcurre del 28 de junio al 4 de julio, sólo se incluyen los casos con inicio hasta el 30 de junio; tres casos con inicio en la SE 53/2025 se conservan en los acumulados. Publicación mensual.