



**SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**

**INFORME SEMANAL DE COVID-19, INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS,
BAJA CALIFORNIA SUR, TEMPORADA ESTACIONAL 2025-2026
Corte: Semana epidemiológica 06-2026 (08 al 14 de febrero de 2026)**

Se informan los casos confirmados de COVID-19, Influenza y Otros Virus Respiratorios (OVR en 10 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER) en Baja California Sur (BCS) en el acumulado de la temporada estacional 2025-2026 (semanas epidemiológicas 40-2025 a 20-2026).-

- En la temporada estacional 2025-2026, a nivel estatal se notificaron **1,030 casos sospechosos de Enfermedad Respiratoria Viral**: Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), en las USMER.
- Los casos sospechosos tuvieron un predominio de personas del sexo femenino de 51.7% con respecto a 48.3% masculinos; los casos tienen una **edad promedio de 36.7 años y la mediana es de 34 años**.


Casos y defunciones positivas a COVID-19 e Influenza en USMER BCS, Temporada 2025-2026

Municipio	Casos de COVID-19	Defunciones por COVID-19	Casos de Influenza	Defunciones por Influenza
Comondú	1	0	0	0
La Paz	17	1	13	1
Los Cabos	12	0	21	0
Loreto	2	0	0	0
Mulegé	0	0	0	0
BCS	32	1	34	1

Fuente: SS/DGE/SINAVE/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- Los casos positivos a COVID-19 tuvieron un predominio de personas del sexo femenino con 64%, con respecto a 36% masculinos; el promedio de edad de los casos es de 42 años y la mediana es de 43.9 años.
- Los casos positivos a Influenza tuvieron un predominio de personas del sexo femenino de 53%, con respecto a 47% masculinos; el promedio de edad de los casos es de 43 años y la mediana es de 45 años.

Casos positivos de COVID-19 e Influenza en Unidades Centinela (USMER) en BCS, Temporada 2025-2026




Fuente: SS/DGE/SINAVE/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

En las semanas recientes, COVID-19 se mantiene con mínima circulación, mientras que influenza es el virus predominante, con incremento a partir de las semanas 52 y 53-2025, observándose un pico en la semana 02-2026.






Defunciones por COVID-19 e Influenza en Unidades Centinela (USMER) por semana epidemiológica en BCS, Temporada 2025-2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- En la temporada 2025-2026 se reporta 1 defunción por COVID-19 (semana 44-2025) y 1 defunción por Influenza (AH1N1; semana 04-2026).

Positividad de pruebas PCR de COVID-19 e Influenza en Unidades Centinela (USMER) en BCS, Temporada 2025-2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- En las semanas recientes, la positividad de COVID-19 es mínima. La positividad de Influenza alcanzó un pico del 16% en la semana 02-2026, actualmente la tendencia es decreciente.

Casos de Infecciones Respiratorias Agudas y Neumonías en BCS, SE-04 2025 vs SE-04 2026


Padecimiento	Casos		Diferencia (%)
	2024	2025	
Infecciones respiratorias agudas (J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0)	15,869	13,598	-14.3%
Neumonías y Bronconeumonías (J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14)	123	141	14.6%

Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE).






Canal endémico de Infecciones Respiratorias Agudas en BCS, SE 04-2026




Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE)

Canal endémico de Neumonías/Bronconeumonías en BCS, SE 04-2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/Sistema de Notificación Semanal de Casos Nuevos (SUAVE)

Casos de Otros Virus Respiratorios (OVR) en el SISVER en BCS, Temporada 2025-2026



Fuente: SS/DGE/SINAVE/ Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- En la Temporada 2025-2026, con respecto a la vigilancia de OVR destacó el predominio del enterovirus-rinovirus humano con 28 casos reportados en el periodo.

